



**Объединение
молодых нефрологов**
России и Новых Независимых Государств

ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК: ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет Минздрава России»
В.С.Соснина, Ж.Г. Симонова

Актуальность и цель

Актуальность проблемы:

- Установлено, что поражения верхних отделов ЖКТ встречаются у больных с почечной недостаточностью чаще, чем среди населения в целом.
- Высокая распространенность и сложность терапии, связанные в основном с достижением ремиссии при патологиях гастродуоденальной зоны, указывают на актуальность комплексного и углубленного исследования поражений верхних отделов ЖКТ у пациентов с хронической почечной патологией.

Цель:

Изучить эндоскопические и морфологические особенности гастродуоденальной патологии у пациентов с ХБП.



Методы

Критерии включения:

- возраст от 18 до 74 лет включительно,
- наличие ХБП С3-С5Д,
- гастродуоденальная патология

Методы исследования:

- эзофагогастродуоденоскопия с забором биопсийного материала

I группа


- ХБП С3
- n=90

II группа

- ХБП С4-С5
- n=84

III группа




- ХБП С5Д
- n=95



Результаты



Результаты эндоскопического исследования



Результаты морфологического исследования

I группа	- Лейкоцитарная инфильтрация слабо выражена - Лимфогистиоцитарная инфильтрация высоко выражена
II группа	- Выраженная лейкоцитарная инфильтрация - Лимфогистиоцитарная инфильтрация умеренной выраженности
III группа	- Выраженная лейкоцитарная инфильтрация - Лимфогистиоцитарная инфильтрация умеренной выраженности

Выводы

- Для пациентов с ХБП С4-С5 и ХБП С5Д в сравнении с пациентами с ХБП С3 характерны более частые эрозивно-язвенные поражения гастродуоденальной зоны.
- Для пациентов с ХБП С3 выраженность морфологических изменений слизистой оболочки гастродуоденальной зоны в большей степени соответствует хроническому воспалительному процессу (лимфогистиоцитарная инфильтрация), для пациентов с ХБП С4-С5 и ХБП С5Д - острому воспалительному процессу (лейкоцитарная инфильтрация).
- Ранняя диагностика и терапия гастродуоденальной патологии у пациентов с ХБП позволят своевременно предупредить развитие желудочно-кишечных осложнений, улучшить качество жизни и осуществить персонализированный подход в диагностической и лечебной тактике ведения этих пациентов.

