



**ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦИИ
БОЛЬНЫХ С ВОЛЧАНОЧНЫМ
НЕФРИТОМ И РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРАПИИ:
20-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ОДНОГО ЦЕНТРА**

**Е.В. ЗАХАРОВА, О.В. ВИНОГРАДОВА, Т.А. МАКАРОВА,
Е.И. ТАРЕЕВА, Е.С. СТОЛЯРЕВИЧ**

**НЕДЕЛЯ НЕФРОЛОГИИ 2015
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 СЕНТЯБРЯ 2015**

СКВ – 173 пациента (1.7% от общего количества пациентов)

Пол	мужской/женский	27/146	15.6/84.4 %
Возраст (лет)	медиана	29 [15; 70]	
Расовая принадлежность	европеоидная/ монголоидная	161/12	93.0/6.9 %
Диагноз СКВ	впервые установлен/ ранее установлен	82/91	47.3 /52.6 %
Длительность наблюдения (мес)	медиана	6 [1; 239]	

**База данных с 1994 года
16 188 учетных карточек
10 035 пациентов**

Биопсия почки				
	<u>1-я биопсия</u>		<u>2-я биопсия</u>	
	n	%	n	%
Всего	100	57.8	15	8.6
<i>Класс I</i>	4	4	1	6.6
<i>Класс II</i>	12	12	2	13.3
<i>Класс III</i>	17	17	3	20
<i>Класс IV</i>	39	39	3	20
<i>Класс V</i>	13	13	2	13.3
<i>Класс V+III/IV</i>	3	3	2	13.3
<i>Класс VI</i>	10	10	2	13.3
<i>Нет ВН</i>	2	2	0	0

Иммуносуперссивная терапия

	Стероиды + циклофосфан		Стероиды + микофенолаты		Стероиды + циклоспорин А		Стероиды + азатиоприн		Только стероиды	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<i>Инициальная</i>	77	50.9	10	6.6	21	13.9	20	13.2	23	15.2
<i>Последующая</i>	4	4.0	24	24.4	19	19.3	23	23.4	28	28.5

- **Только инициальная -151 (87.2%)**
- **Инициальная + последующая - 84 (48.5%)**
- **Только последующая 14 – 8.0%**
- **+ Гидроксихлорохин 44 – 25.4%**
- **Только симптоматическая 8 – 4.6%**

Результаты лечения волчаночного нефрита и общие исходы

	n	%
Ремиссии ВН всего	139	84.2
<i>Полная ремиссия ВН</i>	<i>60</i>	<i>36.3</i>
<i>Частичная ремиссия ВН</i>	<i>79</i>	<i>47.8</i>
Без эффекта	28	16.9
Обострения	29	20.8
Живы, не на диализе	48	27.7
Переведены на диализ	14	8.0
Умерли	19	10.9
Потеряны из наблюдения	92	53.1

Оценка активности и повреждения по SELENA/SLEDAI и SLICC
Срезовое исследование
48 больных, длительность наблюдения 38 [1; 239] месяцев

	SELENA/SLEDAI				SLICC		
	0	2-4	6-8	10-12	0	1-2	3-4
n	20	16	11	1	21	21	6
%	41.6	33.3	22.9	2.0	43.7	43.7	12.5

Волчаночный нефрит в когорте из 48 больных

- **Полная ремиссия - 31 (64.5%)**
- **Частичная ремиссия - 15 (31.2%)**
- **Без эффекта - 2 (4.1%)**

Выводы

- Среди наших пациентов преобладали молодые женщины с впервые установленным диагнозом
- Более чем в половине случаев диагноз волчаночного нефрита верифицирован морфологически, из них у 59% выявлен диффузный или очаговый пролиферативный ВН
- Эффективность терапии составила 84,2%, рецидивы заболевания развились у 20,8% больных, достигших ремиссии
- По данным оценки индексов активности и повреждения в срезовом исследовании 48 больных - у 41.6% пациентов активность СКВ отсутствовала
- При этом полная ремиссия волчаночного нефрита констатирована у 64.5% больных
- Соответственно у 22.9% пациентов имелась внепочечная активность заболевания, представленная в основном серологическими изменениями – повышением титров антител к ДНК и гипокомплементемией при отсутствии клинических проявлений