


Санкт Петербург 2023 год

Обоснование выбора метода доступа для перitoneального диализа

3.1.9-Хирургия

Ильин Илья Андреевич
ГУЗ УОКЦСМП им. Чучкалова

Актуальность проблемы



Главными причинами непрерывного повсеместного возрастания количества больных с хроническими болезнями почек являются изменения социальных условий и демографических характеристик населения Земного Шара, которые привели как в целом к общему старению населения, так и к росту заболеваемости сахарным диабетом (главным образом, 2 типа), артериальной гипертонией и атеросклерозом.

- С середины 90-х годов в мире повсеместно констатируется неуклонный рост числа больных с хроническими болезнями почек, что позволило мировому нефрологическому сообществу поставить вопрос о пандемии хронической болезни почек (далее - ХБП). ХБП страдает от 8 до 16% популяции населения, причем величина этого показателя существенно выше в старшей возрастной группе (15-30% среди лиц старше 60 лет)

Jha V, Garcia-Garcia G, Iseki K et al. Chronic kidney disease: global dimension and perspectives. Lancet 2013; 382: 260-272.


- Распространенность хронической болезни почек быстро растет. В 2017 году у 1 из 11 человек во всем мире констатировалась ХБП, что на 29,3% больше, чем 1990.

GBD Chronic Kidney Disease Collaboration. The global burden of chronic kidney disease. Lancet. 2020 Feb 29; 395(10225): 709–733.doi: 10.1016/S0140-6736(20)30045-3


- Неизбежным исходом всех, (за редким исключением) хронических поражений почек, является хроническая почечная недостаточность. Раз возникнув, она неизбежно прогрессирует до терминальной стадии, когда продолжение жизни возможно только с помощью заместительной терапии почек .

Заместительная терапия почек у больных хронической болезни почек 5 стадии в Российской Федерации 2016-2020 годы

КОЛИЧЕСТВО ОТДЕЛЕНИЙ/ЦЕНТРОВ,
ОБЕСПЕЧИВАВШИХ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ




ДИНАМИКА ЧИСЛА БОЛЬНЫХ С ХБП 5 СТ.,
ПОЛУЧАВШИХ ЗЛП




Андрусев А.М., Перегудова Н.Г., Шинкарев М.Б., Томилина Н.А. Заместительная почечная терапия хронической болезни почек 5 стадии в Российской Федерации 2016-2020 гг. Краткий отчет по данным Общероссийского Регистра заместительной почечной терапии Российского диализного общества. Нефрология и диализ. 2022; 24(4):2

Обеспеченность методом ПД больных хронической болезни почек 5 стадии в Российской Федерации 2016-2020 годы

КОЛИЧЕСТВО ВПЕРВЫЕ ПРИНЯТЫХ БОЛЬНЫХ НА ПД
на млн населения



КОЛИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЮЩИХ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ НА ПД
на млн населения



Показатель	2016	2017	2018	2019	2020
Количество ПД-больных*	в абр. цифрах	2353	2405	2585	2735
	на 1 млн нас.	16,0	16,4	17,6	18,6
Количество ПД-больных, впервые принятых на лечение в течение года*	в абр. цифрах	687	646	785	979
	на 1 млн нас.	4,7	4,4	5,3	6,7
					5,7

Андрусев А.М., Перегудова Н.Г., Шинкарев М.Б., Томилина Н.А. Заместительная почечная терапия хронической болезни почек 5 стадии в Российской Федерации 2016-2020 гг. Краткий отчет по данным Общероссийского Регистра заместительной почечной терапии Российского диализного общества. Нефрология и диализ. 2022; 24(4):2

Перitoneальный диализ высококачественный и экономически эффективный метод диализа, неотъемлемая часть программ заместительной терапии почек.

- Для развития ПД подчеркивается необходимость инфраструктуры, административных и политических решений, образования провайдеров и персонала для поддержки индивидуальных инициатив, направленных на улучшение понимания ПД. Экономические преимущества, однако, не всегда приводят к увеличению использование перitoneального диализа.
- Барьеры, которые ограничивают медицинскую помощь методами ПД являются: экономические и финансовые факторы, связанные с системой оказания медицинской помощи, недостаточно эффективный отбор пациентов на метод лечения, отсутствие возможности в выборе метода диализа у пациента, наличие предубеждений у медицинского персонала, позднее направление к нефрологу и хирургу, который формирует доступ для ПД или недоступность их, отсутствие координации с нефрологом по вопросам доступа для диализа, неоптимальный способ имплантации ПД-катетера, несостоятельность метода ПД из-за осложнений, в том числе и доступа для ПД .
- В настоящее время существует противоречие относительно того, какая техника имплантации ПД-катетера превосходит другой подход к формированию доступа и лучше всего подходит для спасения его дисфункции
- Важнейшей предпосылкой обеспечения должного качества лечения, а, следовательно, и качества жизни больных является создание единых рекомендаций по формированию и уходу за доступом для диализа и организацией центров/отделений по формированию и реконструкции и лечению осложнений доступа для диализа в каждом регионе. Она, опосредованно, позволит увеличить количество пациентов, которые получают лечение данным методом с меньшим количеством осложнений, связанных с доступом, и, при этом, достигается более длительного время его использования, что, в конечном счете, приведет к экономии ресурсов здравоохранения.

Цель исследования

- Обоснование применения лапароскопической техники имплантации катетера для перitoneального диализа и повышение эффективности лечения больных методом перitoneального диализа при состояниях при ХБП 5 стадии.
- Расширение границ показаний к замещающей терапии почек методом перitoneального диализа.

Задачи исследования

1. Оценить возможности влияния хирургической тактики имплантации перitoneального катетера у больных с хронической болезнью почек, требующих терапии методами диализа, на развитие неинфекционных осложнений связанных с катетером, требующих дополнительного хирургического лечения
2. Определить сравнительную частоту хирургических противопоказаний к проведению перitoneального диализа у больных с хронической болезнью почек в зависимости от тактики имплантации перitoneального катетера.
3. Оценить влияние лапароскопической техники имплантации перitoneального катетера на потребность перевода больных с перitoneального диализа на гемодиализ.
4. Установить влияние лапаротомической тактики имплантации перitoneального катетера на частоту periоперационных осложнений .
5. Установить перспективность лапаротомической техники по расширению объема интраабдоминального вмешательства с целью повышению качества проведения перitoneального диализа.
6. Оценить сравнительную связь хирургической тактики имплантации перitoneального катетера и выживаемости метода перitoneального диализа

Материалы и методы




- В исследование были включены 1237 пациента при состояниях, отягощающих течение ХБП 5 стадии, которые получали медицинскую помощь методом ПД и наблюдались в 26 диализных центрах FME RF в период, где был имплантирован катетер для ПД между 2000 и 2020 годами.
- Характеристики пациента, хирургический анамнез и информация о последующем наблюдении были получены ретроспективно из медицинских записях из системы базы данных.

- Время наблюдения определялось как день имплантации катетера для ПД до фатального исхода пациента или даты удаления катетера.
- Представленный фактический материал 1400 формирований доступа для перитонеального диализа. Период наблюдения составил от 2 до 5092 дней лечения ($878,70 \pm 21,43$ дня лечения).
- Все имплантации были выполнены и наблюдались разными хирургами, и техника имплантации катетера для перитонеального диализа была хирургическая (88,72%), лапароскопическая (10%) или комбинация их.
- На начало 2020 года из них 465 продолжали функционировать, 935 не использовались для перитонеального диализа. Из числа представленных данных с учетом техники имплантации катетера для ПД сформировали две группы.


Основные характеристики пациентов, которым оказывается медицинская помощь методом перitoneального диализа.

Параметры	Открытая хирургия	Лапароскопия	Сравнение I и II групп**	Повторные имплантации
n	1105	123		59
Возраст на момент имплантации, лет	52,40±0,48	51,90±1,28	p =0,71461	53,80±2,15
<45 лет, %	31,9	34,2		28,8
45-65 лет, %	43,9	45,5		40,7
>65 лет, %	24,2	20,3		30,5
Сахарный диабет*, %	29,1	29,3		37,3
Мужчины, %	43,2	46,3		33,9
ИМТ на момент имплантации, кг/м ²	24,77±0,13	25,35±0,41	p =0,17775	24,92±0,74
>30 кг/м ² , %	11,7	13,8		17,9
Гемоглобин на момент имплантации, г/л	95,85±0,54	96,57±1,49	p=0,64969	99,30±2,77
< 90, г/л, %	34,7	39,8		35,6
Альбумин на момент имплантации, г/л	36,81±0,17	36,45±0,63	p=0,58126	36,27±0,55
<36, г/л, %	37,5	40,7		47,5
СКФ на момент имплантации, мл/мин	7,43±0,09	6,63±0,25	p=0,00266	7,41±0,46
Индекс коморбидности Чарлсона	3,81±0,05	3,84±0,15	p=0,84955	4,75±0,24
Индекс коморбидности Чарлсона учетом возраста	5,27±0,07	4,97±0,18	p=0,12059	6,24±0,35

Заболевания, вызвавшие развитие ХБП 5 стадии, у пациентов при имплантации катетера для перitoneального диализа




Первая группа




Вторая группа

Частота причин остановки или прекращения метода связанные с катетером для ПД



I группа



II группа

Метод имплантации ПД-катетера	Группа I	Группа II
Не инфекционные осложнения	531	55
Остановки или прекращения метода ПД, связанные с катетером	90* (16,95 %)	1 (1,82 %)

* различие с группой II достоверно ($p=0.006$)

Сравнение частота потерь и миграции ПД-катетера в зависимости от метода имплантации

Метод имплантации ПД-катетера	Потери ПД-катетера	Миграция ПД-катетера
I группа, n=1105	833* ** (75,3%)	122 (11%)
II группа, n=123	43 *** (34,9%)	14 (11,3%)
III группа, n=59	45 (76,2%)	6 (10,1%)
2.1 подгруппа, n=61	16 (26,2%)	2 (3,2%)
2.1.1 под подгруппой, n=18	1 (5,5%)	0 (0,0%)

*различие между группой I и II достоверно, P <0,001.

** различие между группой I и подгруппа 2.1 достоверно, P <0,001.

*** различие между группой II и подподгруппой 2.1.1, P <0,001.

Лапароскопическая техника имплантации перitoneального катетера позволяет добиться меньшей частоты ранних неинфекционных осложнений связанных с катетером, в том числе при раннем экстренном начале диализе, потребности в повторных хирургических вмешательствах по сравнению с лапаротомическим доступом.

Лапароскопическая техника имплантации катетера для ПД вероятно позволяет экстренно или неотложно начать метод лечения без риска протекания диализата

Техника имплантации ПД-катетера	Количество дней от момента имплантации ПД - катетера до начала использования, $M \pm m$	Количество пациентов	Протекание диализата	Повторное протекание диализата
Группа I, n=1105	9,40±0,14	447	23(5,15%)	5(1,12%)
Группа II, n=123	9,86±0,45	42	0	0

*Различия достоверны по сравнению с группой I.

Лапароскопическая техника имплантации позволяет сузить противопоказания к ПД у больных с поликистозной болезнью почек

Динамика роста числа пациентов с поликистозной болезнью почек

Параметры	до 01.01.2011	от 01.01.2011 до 31.12.2015	после 31.12.2015
Пациенты Q61 (код МКБ-10)	9	42	35
Группа I, Открытая хирургия	9	39* (92.8%)	25 ** (71.4%)
Группа II, Лапароскопия	0	3 (7,1%)	10 (28,6%)

* различие с группой II достоверно ($P= 0.029$)

** различие с группой II достоверно ($P= 0.029$)

Динамика роста числа операций у пациентов с поликистозной болезнью почек

Параметры	до 01.01.2011	от 01.01.2011 до 31.12.2015	после 31.12.2015
Имплантации ПД катетера при Q61 (код МКБ-10)	9	44	38
Группа I, Открытая хирургия	9	41* (93,2%)	27** (71%)
Группа II, Лапароскопия	0	3 (6,8%)	11 (29,0%)

* различие с группой II достоверно ($P= 0.019$)

** различие с группой II достоверно ($P= 0.019$)¹⁴

Лапароскопическая техника имплантации позволяет сузить противопоказания к ПД у больных с предшествующими лапаротомиями

Пациенты ХБП 5 и техника имплантации ПД-катетера	Операции на брюшной полости		
	не было	в анамнезе операция	операции на верхнем этаже брюшной полости
I группа, n=1105	916* (82,9%)	189 (17,1%)	27** (2,4%)
II группа, n=123	100 (81,3%)	23*** (18,7%)	4 (3,3%)
2.1.1подподгруппа, n=18	8 (44,4%)	10 (55,6%)	3 (16,7%)

* разница достоверна между Группой I и подподгруппа 2.1.1, p <0,001.

** разница достоверна между Группой I и подподгруппа 2.1.1, p = 0.003.

*** разница достоверна между Группой II и подподгруппа 2.1.1, p = 0.002.

Распределение больных, выбывших из программы перitoneального диализа по причине трансфера на ГД и летального исхода, в зависимости от техники имплантации перitoneального катетера

Параметры	Техника имплантации ПД-катетера			
	Группа I, n=1105	Группа II, n=123	Группа III, n=59	Подподгруппа 2.1.1, n=61
Трансфер на ГД	** 359* (32,5%)	24(19,5%)	22(37,3%)	8(13,1%)
Фатальный исход	**** 234*** (21,2%)	15(12,2%)	9(15,3%)	5(8,2%)

* Разница достоверна между группами I и II, уровень значимости p= 0.005.

** Разница достоверна между группами I и подподгруппой 2.1.1, уровень значимости p= 0.003.


*** Разница достоверна между группами I и II, уровень значимости p= 0.017.

**** Разница достоверна между группами I и подподгруппой 2.1.1, уровень значимости p=0.023.

Лапароскопическая техника имплантации катетера связана со снижением частоты перевода больных на гемодиализ

Трансфер на ГД как причина прекращения использования метода ПД


В зависимости от варианта имплантации у женщин



Группа	Трансфер на ГД
I группа, женщины, n=628	211* (33,60%)
II группа, женщины, n=66	13 (19,70%)

* различие с группой II достоверно, p= 0.037.


В зависимости от индекса массы тела



Группа	ИМТ, кг/м ²	Трансфер на ГД
I группа, n=463	28,92±0,16	155* (33,48%)
II группа, n=58	29,06±0,45	11 (18,97%)

* различие с группой II достоверно, p= 0.031.

Зависимость трансфера на гемодиализ от техники имплантации доступа и период использования метода



период	Пациенты на лечении методом ПД	Трансфер на ГД, I группа	Трансфер на ГД, II группа
до 01.01.2011	165	20 (12,1%)	0(0,0%)
от 01.01.2011 до 31.12.2015	519	151 (29%)	3(0,58%)
после 31.12.2015	553	188* (33 %)	21(3,8%)

* различие с группой II достоверно, уровень значимости $p < 0,001$.

Структура причин прекращения или остановки метода ПД в зависимости от метода имплантации

Причины остановки или прекращения метода ПД	Техника имплантации ПД-катетера		
	Группа I открытая хирургия	Группа II лапароскопия	Группа III повторные имплантации
Все	825 (100 %)	48 (100%)	43 (100%)
Неадекватный диализ	57 (6,8%)	6 (12,5 %)	6 (14,0%)
Инфекционные осложнения	296 (35,5%)	17 (35,4%)	14 (32,6%)
Психосоциальные	6 (0,7%)	2 (4,2 %)	0 (0,0%)
Связаны с катетером	90 (10,8%)	1 (2,1%)	3 (7,0%)
Другие	376 (45,1%)	22 (45,8%)	20 (46,5%)

Лапароскопическая техника имплантации ПД-катетера связана с меньшей частотой periоперационных осложнений и дополнительных хирургических вмешательств по сравнению с лапаротомической.

Лапароскопическая техника имплантации ПД-катетера связана с меньшей частотой инфекционных осложнений

Доля пациентов без инфекционных осложнений в зависимости от метода имплантации катетера.

Группа	Количество пациентов без эпизодов	
	инфекции МВК и туннельной инфекции	диализный перитонит
I группа, n=1105	679 (61,45%)	500 (45,25%)
II группа, n=123	98 (79,67%)	79 (64,23%)
p	<0,001	<0,001.


Отсутствие эпизодов перитонита в зависимости от техники имплантации и частоты механических осложнений

Параметры	Техника имплантации ПД-катетера		
	Группа I, n=1105	Группа II, n=123	
		Подгруппа 2.1 лапароскопии, с фиксацией катетера, n=61	Подгруппа 2.2 лапароскопии, без фиксации катетера, n=62
Количество пациентов без эпизодов перитонита	500*(45,25%)	44(72,13%)	35(56,45%)
Пациенты с поздними механическими осложнениями	338** (30,59%)	10(16,39%)	24(38,71%)


* различие с подгруппой 2.1 достоверно, p <0,001.

** различие с подгруппой 2.1 достоверно, p=0.027. 20

Причины прекращения или остановки метода ПД у женщин



Инфекционные осложнения



Группа	Причины остановки или прекращения метода ПД у женщин	
	инфекционные осложнения	связаны с катетером
Группа I n=677	178 *(26,29%)	50 (7,39%)
Группа II n=67	8(11,94%)	0 (0,00%)

* Различие с группой II достоверно (р= 0.015)

Нами констатировано, что инфекционные осложнения, как причины или остановки метода ПД, достоверно реже встречаются у женщин при лапароскопическом подходе к имплантации.


Механические осложнения в зависимости от метода имплантации ПД-катетера

Параметры	Техника имплантации			
	Группа I, n=1196	Группа II, n=126	Группа III, n=60	Подгруппа 2.1 лапароскопии, с фиксацией катетера, n=62*
Обструкция оттока	13(1,0%)	4(3,1%)	0(0,0%)	1(1,61%)
Обертывание сальником	42(3,5%)	3(2,3%)	2(3,3%)	1(1,61%)
Миграция, дислокация	168*(14,0%)	20** (15,8%)	3(5,0%)	3 (4,84%)
Спайки брюшной полости	12(1,0%)	1(0,7%)	1(1,6%)	0(0,00%)
Грыжи брюшной стенки операции	67(5,6%)	4(3,1%)	3(5,0%)	2(3,22%)
Экструзия манжеты	87(7,2%)	8(6,3%)	6(10,0%)	1(1,61%)
Гидроцеле Tunica vaginali	9(0,7%)	1(0,7%)	0(0,0%)	0(0,00%)
Перикатетерная протечка	58(4,8%)	7(5,5%)	8(13,3%)	4(6,45%)
Механическое повреждение катетера	28(2,3%)	1(0,7%)	0(0,0%)	0(0,00%)
Перфорация внутренних органов	3(0,2%)	0(0,0%)	1(1,6%)	0(0,00%)
Острая кишечная непроходимость	30(2,5%)	5(3,9%)	2(3,3%)	2(3,22%)


* Различие достоверно в группе I и подгруппе 2.1, p= 0.036

** Различие достоверно в группе II и подгруппе 2.1 p= 0.033

Пациенты с поздними механическими осложнениями в зависимости от техники имплантации ПД-катетера



Группа I, n=1105





Подгруппа 2.1 лапароскопии,
с фиксацией катетера, n=61

Параметры	Техника имплантации		
	Группа I, n=1105	Группа II, n=123	Подгруппа 2.1 лапароскопии, с фиксацией катетера, n=61
Пациенты с поздними механическими осложнениями	338* (30,59 %)	34(27,64 %)	10(16,39 %)

* различие с подгруппой 2.1 достоверно p= 0.027

Частота дополнительных оперативных вмешательств у пациентов ХБП 5 стадии, в зависимости от техники имплантации ПД-катетера



Пациенты ХБП 5 стадии	Техника имплантации ПД-катетера	
	Группа I, n=1105	Группа II, n=123
Повторная имплантация	53(4,7%)	2(1,6%)
Реимплантация	85 (7,6%)	3(2,4%)
Все дополнительные оперативные вмешательства	138* (12,4%)	5 (4%)



* различие с группой II достоверно ($p=0.009$)

Структура операций по имплантации катетера для перitoneального диализа

Имплантация ПД-катетера	Техника имплантации катетера для перitoneального диализа		
	все	Группа I открытая хирургия.	Группа II лапароскопия
Все	1382	1242 (89.9%)	140 (10.1%)
Имплантации единственного ПД-катетера	1085	967 (89.2%)	118 (10.8%)
Повторная имплантация, первый ПД-катетер	55	53 (96.4%)	2 (3.6%)
Повторная имплантация, второй ПД-катетер	55	44*(80%)	11 (20%)
Повторная имплантация, третий ПД-катетер	3	2*(66.7%)	1 (33.3%)
Перитональный диализ с реимплантацией катетера, единая техника	164	158 (96.3%)	6 (3.7%)
Перитональный диализ с повторной реимплантацией ПД-катетера, единая техника	18	18 (100%)	0 (0,0%)
Перитональный диализ с повторной имплантацией ПД-катетера, повторная реимплантация единая техника	0	0 (0,0%)	2 (100%)

* сравнение частоты повторных операций при открытой хирургии и лапароскопии, уровень значимости p=0.019

Частота реимплантаций по причине, связанной доступом для ПД в зависимости от техники имплантации катетера



Параметры	Техника имплантации катетера для перitoneального диализа	
	Группа I открытая хирургия	Группа II лапароскопия
Все имплантации	1242	140
Реимплантация	91*	3
Причина, связанная с катетером	46	0
Доля реимплантаций по причине, связанной с катетером для ПД	50,55	0
Доля реимплантаций от всех имплантаций в зависимости от метода	7,33	2,14

* различие с группой II достоверно, уровень значимости $p=0.044$

Дополнительные вмешательства во время операции, фиксация ПД-катетера, в зависимости от метода имплантации ПД-катетера

Дополнительные вмешательства	I группа, n=1196	Лапароскопия		III группа, n=60
		II группа, n=126	Подподгруппой 2.1.1, туннель в прямой мышце, n=19	
Все фиксации ПД-катетера	9 (0,7%) * **	62 (49,2%)	19 (100,0%)	11 (18,3%)
туннель в прямой мышце	0(0,0%) *** ****	13 (10,3%)	19 (100,0%)	6 (10,0%)
фиксация швом к передней брюшной стенке	9 (0,7%) *****	49 (38,8%)	0(0,0%)	5 (8,3%)

* Разница с группой II достоверна, p <0,001

** Разница с подподгруппой 2.1.1 достоверна, p <0,001

*** Разница с группой II достоверна, p <0,001


**** Разница с подподгруппой 2.1.1 достоверна, p <0,001

***** Разница с группой II достоверна, p <0,001

Лапароскопическая тактика позволяет производить дополнительные хирургические вмешательства (репозиция катетера, адгезиолизис, оментопексия, тоннель в прямой мышце), необходимые для проведения ПД.

Дополнительные вмешательства, без учета фиксации ПД-катетера, во время операции в зависимости от метода имплантации

Дополнительные вмешательства	I группа, n=1196	Лапароскопия		III группа, n=60
		II группа, n=126	Подподгруппа 2.1.1. туннель в прямой мышце n=19	
Без учета фиксации ПД-катетера	* ** 35 (2,9%)	*** 11(8,7%)	18(94,7%)	13(21,6%)




- *разница достоверна между группой I и группой II, уровень значимости p=0,002.
- ** разница достоверна между группой I и подподгруппой 2.1.1., уровень значимости P<0,001.
- *** разница достоверна между группой II и подподгруппой 2.1.1., уровень значимости P <0,001.


Дополнительные вмешательства при формировании доступа в зависимости от индекса массы тела, без учета фиксации ПД-катетера

Группа	ИМТ, кг/м ²	Дополнительные вмешательства во время имплантации без учета фиксации ПД-катетера
I группа, n=487	28,92±0,15	14* (2,87%)
II группа, n=59	29,06±0,45	5 (8,47%)

* различие с группой 2 достоверно, уровень значимости p= 0.066



I группа, n=487




II группа, n=59


Дополнительные вмешательства, без фиксации ПД-катетера

при повторных формированиях доступа

Повторные имплантации	Дополнительные вмешательства во время имплантации без фиксации ПД-катетера
I группа, n=46	3 (6,5%)
II группа, n=14	10 (71,4%)
p	<0,001




I группа




II группа

при реимплантациях доступа

Реимплантации	Дополнительные вмешательства во время имплантации без фиксации ПД-катетера
I группа, n=176	2 (1,1%)
II группа, n=8	2 (25,0%)
p	=0.002




I группа



II группа

Лапароскопическая техника имплантации повышает выживаемость метода перitoneального диализа.



Проверка равенства распределений выживания метода в зависимости от сахарного диабета, уровня альбумина, возраста, техники имплантации катетера для перitoneального диализа

Подгруппы	Метод	p
Сахарный диабет (да, нет)	Log Rank (Mantel-Cox)	0,0001
Возраст, (<65 и ≥65 лет)		0,0001
Альбумин, (<36 и ≥36 г/л)		0,0001
Техника имплантации катетера (открытая хирургия и лапароскопия с фиксацией)		0,005

Выводы

1. Лапароскопическая техника имплантации перitoneального катетера позволяет добиться меньшей частоты ранних неинфекционных осложнений связанных с катетером, в том числе при раннем экстренном начале диализе, потребности в повторных хирургических вмешательствах по сравнению с лапаротомическим доступом.
2. Лапароскопическая техника имплантации позволяет сузить противопоказания к перitoneальному диализу у больных с поликистозной болезнью почек и предшествующими лапаротомиями.
3. Лапароскопическая техника имплантации катетера связана со снижением частоты перевода больных на гемодиализ.
4. Лапароскопическая техника имплантации перitoneального катетера связана с меньшей частотой периоперационных осложнений и дополнительных хирургических вмешательств по сравнению с лапаротомической.
5. Лапароскопическая тактика позволяет производить дополнительные хирургические вмешательства, необходимые для проведения ПД.
6. Лапароскопическая техника имплантации повышает выживаемость метода перitoneального диализа.